

위내시경(EGD) 및 대장내시경 검사 안내사항 (TRILYTE 및 BISACODYL 준비 포함)

이 안내사항은 절차를 실시하기 1 주일 전에 읽어보십시오.

위내시경 검사란 무엇인가요?

EGD(위내시경 또는 상부 위장관 내시경)는 지속적인 상부 위장의 통증, 메스꺼움, 구토, 삼킴 장애 증상을 검사하기 위해 실시됩니다. 상부 위장관(GI Tract)의 출혈 원인을 찾고 가능한 치료 방법을 제시하는 데도 이용됩니다.

대장내시경 검사란 무엇인가요?

대장내시경 검사는 의사가 대장 내 이상 여부를 검사하는 절차입니다. 광섬유로 이루어진 작은 비디오 카메라가 달린 얇고 유연한 관을 항문으로 삽입하여 직장과 대장 안으로 서서히 밀어 넣습니다.

언제 도착해야 하며 절차 시간은 얼마나 걸리나요?

절차 시작 30 분 전에 GI Lab 에 도착하도록 하십시오. 그래야 필요한 조치 및 마취(해당될 경우)를 실시하고 담당 의사가 환자 상태를 확인하며 절차에 필요한 적절한 조치를 취할 수 있습니다. GI Lab 에서 1 시간 반에서 2 시간 정도를 소요하게 됩니다.

주의 사항:

예정된 일정은 North Shore 에서 제공할 수 있는 가장 정확한 예정일입니다.

하지만, 긴급상황과 같은 불가피한 상황이 발생할 경우 예정일이 변경될 수 있습니다. 예정된 일정에 변동이 있을 경우 최선을 다해 귀하께 공지하도록 하겠습니다.

GI Lab 위치

Evanston Hospital	2650 Ridge Ave	1134 호실	Evanston, IL 60201	(847) 570-2236
Glenbrook Hospital	2100 Pfingsten Road	1 층	Glenview, IL 60026	(847) 657- 5780
Highland Park Hospital	777 Park Ave West	B345	Highland Park, IL 60035	(847) 480-2828
Highland Park Medical Group Gastroenterology	1777 Green Bay Road	201	Highland Park, IL	(847) 681-4229
Skokie Hospital	9600 Gross Point Road	1 층	Skokie, IL 60076	(847) 933-6565
Vernon Hills Specialty Suites	225 N. Milwaukee Ave.	1 층	Vernon Hills, IL 60061	(847) 941-7660

당뇨를 앓고 있는 경우에는 어떻게 해야 하나요?

1 차 진료 의사(PCP)에게 대장내시경 검사 전에 당뇨병 약을 복용해야 하는지 문의하시고 지시에 따르십시오.

혈액 희석제를 복용하거나 심장 스텐트를 삽입한 경우에는 어떻게 해야 하나요?

심장 스텐트를 삽입했거나 Coumadin, Plavix, Ticlid, Lovenox, Pradaxa, Xarelto 또는 기타 혈액 희석제를 복용하는 경우, 처방 의사에게 절차 전에 해당 약물을 중단해야 하는지 확인하십시오. 이 중 하나 이상의 약물 복용을 계속해야 하는 경우에는 North Shore로 알려주십시오. 아스피린이나 기타 NSAID(Advil, Aleve, Ibuprofen 등)는 절차 전에 복용해도 좋습니다.

심장 세동 제거기 또는 맥박 조정기를 사용하는 경우에는 어떻게 해야 하나요?

검사 예정일 6 개월 전에 해당 장비를 검사하십시오. NorthShore 시설에서 검사할 수 없는 경우, 다른 검사 시설에서 해당 장비를 검사했다는 확인서를 절차 당일 가져오십시오.

심장 세동 제거기 또는 맥박 조정기를 사용하는 경우 검사 전 GI Lab으로 연락하십시오.

Glenbrook	(847) 657-5780
Evanston	(847) 570-2236
Highland Park	(847) 480-2828
Skokie	(847) 933-6565

❖ 절차 7 일 전 지침:

- 약국에서 처방약(TriLyte 및 Bisacody 4 정)을 조제받으십시오.
- 빈혈치료제, Pepto Bismol 및 생약 보조제 복용을 중단하십시오.
- 가능한 경우 절차 전 1 주일 동안 씨앗, 견과류, 옥수수를 먹지 마십시오.
- 배변 준비를 위해 다량의 액체를 마실 경우 구토가 염려되면 NorthShore 사무실 (847) 657 1900 번으로 전화해 구토 방지 약물 처방을 요청하십시오.
- 위내시경 및 대장내시경 검사에 대한 간략한 정보 프로그램은 <http://www.my-emmi.com/enhqi>에서 보실 수 있습니다.
- 절차 전 사전 승인을 받아야 하는지 또는 1 차 진료 의사의 의뢰서가 필요한지에 대해 보험회사에 문의하십시오.

❖ □ 절차 하루 전 지침:

- 지침에 따라 TriLyte 를 준비하고 저녁에 사용할 수 있도록 냉장고에 넣어두십시오.
- 하루 종일 투명한 액체만 마십시오. 빨간색이나 보라색 액체는 마시지 마십시오. 허용되는 액체는 아래와 같습니다.

수프:	맑은 부용, 국물 또는 콩소메
음료:	차, 커피, 무카페인 차/커피, Kool-Aid, 게토레이, 7UP, Sprite, 진저 에일 등의 맑은 탄산음료. 차나 커피에 우유 또는 크림을 넣지 마십시오.

주스:	사과, 백포도 주스, 여과한 레모네이드, 라임에이드, 오렌지 음료, Crystal Light . 속이 보이거나 알맹이가 없는 주스는 허용됩니다.
디저트	빙과류, 이탈리아 아이스, 팝시클, JELL-O , 하드 캔디.

오후 12 시: Bisacodyl 2 정을 물과 함께 복용하여 대장내시경 검사 준비를 시작하십시오. 약을 부수거나 씹어서 먹지 마십시오. 재산제 복용 후 1 시간 이내에 Bisacodyl 을 복용하지 마십시오.

오후 2 시: Bisacodyl 2 정을 물과 함께 복용하십시오. 약을 부수거나 씹어서 먹지 마십시오.

오후 5 시: 지시에 따라 2 시간 동안 나누어 TriLyte 액을 마십시오. 10-20 분마다 8 온스씩(2 리터 또는 용기의 1/2) 8 온스 잔으로 총 8 번을 마십시오. TriLyte 용기에 1,2,3 리터 눈금이 표시되어 있을 수도 없을 수도 있습니다.

나머지 TriLyte 2 리터는 오전에 사용할 수 있도록 보관해 두십시오.

급하게 마시면 위장에 탈이 생길 수 있으므로 천천히 마시되, 용액을 모두 마실 수 있도록 계획을 세우십시오. 빨대를 이용하면 마시는 데 도움이 될 수 있습니다. 용액을 마시기 전에 레몬즙을 마셔보십시오. 준비를 완료할 수 없거나 구토가 나올 경우에는 **(847) 657-1900** 번으로 전화해 의사와 상담하십시오.

배변 준비를 시작한 후에는 어떤 일이 발생하나요?

무른 변을 여러 번 볼 수 있습니다. 처음에는 약간 배가 부른 느낌이 들 수도 있지만 배변을 계속하면 편안함을 느끼게 됩니다. 용액을 다 마신 후에도 설사가 계속될 수 있습니다.

❖ 절차 당일 지침:

- 아침에 TriLyte 를 복용하는 것을 제외하고 자정이 지난 후에는 아무 것도 먹거나 마시지 마십시오.
- 예약 시간 3 시간 전(대장내시경 일정이 오전 8 시인 경우 오전 5 시, 오전 9 시인 경우 오전 6 시)에 8 온스 TriLyte 를 4 잔 더(1 리터) 마십시오.
- TriLyte 4 잔(1 리터)을 다 마신 후에도 변이 맑거나 노란색이 아니고 대변에 찌꺼기나 고체가 섞여 있다면 나머지 용액(추가 1 리터, 총 4 리터)을 마십시오. 1 시간 안에 나머지 용액을 모두 마십시오.
- 절차 2 시간 전부터는 TriLyte 를 복용하지 마십시오. 1 시간 안에 1-2 리터의 용액을 복용함으로써 위장에 탈이 날 것이 염려되면 절차가 시작되기 3 시간 전보다 일찍 복용을 시작하십시오. 절차 2 시간 전부터는 이 용액을 마시면 안됩니다.

대장을 완전히 비우기 위해서는 오전에 TriLyte 를 모두 마셔야 합니다.

절차 당일 아침에 약물을 복용해야 하나요? 심장약이나 혈압약을 복용하고 있는 경우 절차 당일 아침에는 해당 약품을 약간의 물과 함께 복용합니다. 다른 약물은 의사의 별도 지시가 없는 경우 절차 후에 복용할 수 있습니다.

특별 지시사항:

1. 절차 완료 후 제시간에 귀가할 수 있도록 누군가 동행해 줄 수 있어야 하며 이는 **필수** 조치입니다. 보통 절차 시작 후 2-3 시간 후면 귀가하게 됩니다. 대중 교통을 이용할 예정이면 성인과 동행해야 합니다.

2. 절차 실시 과정에 진정제가 사용되며 따라서 절차 후 당일에는 운전을 하거나 기계를 조작하는 것은 안전하지 않습니다.
3. 절차 당일에는 직장으로 돌아갈 수 없습니다.
4. 절차 당일에는 중요한 결정을 내리지 마십시오.
5. 간호사와 상담을 하거나 절차를 취소해야 하는 경우 NorthShore 본사에 (847) 657-1900 번으로 전화하십시오. 절차를 취소해야 한다면 예정 검사일로부터 최소한 1 주일 전에 통보해 주십시오.



대장내시경 검사 보험 적용 관련 정보

대장내시경 검사(조명이 부착된 유연한 내시경을 이용한 대장 검사)를 예약하셨습니다. 대장내시경 검사를 진행하는 동안 이상이 발견되면 일반적으로 생체 검사가 즉시 이루어집니다. 생체 검사는 이상이 있는 부분의 일부 또는 전체를 떼내어 현미경으로 검사하는 과정입니다.

보험 회사에서는 대장내시경 검사를 해당 보험 혜택에 따라 다른 방식으로 처리합니다. “선별 검사”를 위해(대장에 아무런 징후도 없는 경우) 대장내시경 검사를 예약했지만 의사가 절차 중에 제거해야 하는 용종이나 조직을 발견한 경우 대장내시경 검사는 더 이상 선별 검사를 위한 절차로 간주되지 않습니다. 보험 혜택이 변경되고 보험금이 다르게 지급될 수 있습니다.

주의 사항:

대장 세척 준비를 시작하기 전에 사전 승인이거나 사전 인증을 받아야 하는지, 절차 비용을 누가 지불하게 되는지 보험 회사에 확인하시기 바랍니다. 보험 카드 뒷면에 기재된 전화번호로 전화하십시오.

