

Sigmoidoskopya

Mangyaring basahin ang mga tagubilin na ito isang linggo bago ang iyong pamamaraan.

Ano ang isang Sigmoidoskopya?

Naibabaluktot na sigmoidoskopya ay isang diagnostikong pamamaraan na ginagamit upang salain ang mga abnormalidad sa sigmoid na kolon. Ang pamamaraang ito ay sumusuri sa sigmoid na kolon (mababang ikatlo ng kolon) na ginagamit ang isang nailawang naibabaluktot na scope na ipinapasok sa butas ng puwit at umaabot hanggang sa esplenikong kurba. Posible na kumuha ng biyopsiya sa panahon ng pamamaraan.

Anong oras ako darating at gaano katagal aabutin ang pamamaraan?

Mangyaring dumating sa GI Lab 30 minuto bago ang pamamaraan, upang ang pangangalaga, anestesiya (kung maikakapit at ang manggagamot ay masusuri ka at ihanda ka para sa iyong pamamaraan. Iplano na gumugol ng humigit-kumulang 1 ½-2 oras sa GI Lab.

Mangyaring tandaan:

Ang oras ng iyong pamamaraan ay iniskedyul ay ang aming pinakamahusay na pagtataya kung kailan magsisimula ang iyong pamamaraan. Kalagayan ay lilitaw, hal, emerhensiya, na maaaring bumago ng iniskedyul na oras. Gagawin namin ang aming makakaya upang abisuhan ka sa anumang mga pagbabago sa iskedyul.

Mga Lokasyon ng GI Lab

Ospital ng Evanston	2650 Ridge Ave.	Silid 1134	Evanston, IL 60201	(847) 570-2236
Ospital ng Glenbrook	2100 Pfingsten Road	1 ^{ng} Palapag	Glenview, IL 60026	(847) 657- 5780
Ospital ng Highland Park	777 Park Ave West	B345	Highland Park, IL 60035	(847) 480-2828
Grupong Medikal ng Highland Park Gastroenterolohiya	1777 Green Bay Road	201	Highland Park, IL	(847) 681-4229
Ospital ng Skokie	9600 Gross Point Road	1 ^{ng} Palapag	Skokie, IL 60076	(847) 933-6565
Mga Specialty Suite ng Vernon Hills	225 N. Milwaukee Ave.	1 ^{ng} Palapag	Vernon Hills, IL 60061	(847) 941-7660

Ano ang dapat kong gawin kung ako ay isang diyabetiko?

Mangyaring tanungin ang iyong manggagamot ng primaryang pangangalaga (MPP) upang tagubilinan ka tungkol sa iyong pag-inom ng mga gamot sa diyabetis bago ang iyong Sigmoidoskopya.

Ano ang dapat na gawin ko kung ako ay umiinom ng pampalabnaw ng dugo o mayroong stent sa puso?

Kung mayroon kang stent sa puso O umiinom ka ng gamot tulad ng Coumadin, Plavix, Ticlid, Lovenox, Pradaxa, Xarelto o anumang ibang pampalabnaw ng dugo, mangyaring kontakin ang iyong nagresetang manggagamot upang matiyak kung dapat mong ihinto ang gamot na ito bago ang pamamaraan. Abisuhan ang aming opisina kung ikaw ay pinayuhan na hindi huminto sa isa o higit pa sa mga gamot na ito. AYOS lamang na ipagpatuloy ang aspirin o ibang NSAIDs (Advil, Aleve, Ibuprofen, atbp) bago ang iyong pamamaraan.

Ano ang dapat kong gawin kung ako ay mayroong dispibrilador o pacemaker sa puso?

Iyong aparato ay dapat matsek sa loob ng 6 buwan ng iyong iniskedyul na pamamaraan. Kung hindi pa ito natsek sa isang pasilidad ng Northshore, mangyaring magdala ng dokumentasyon sa araw ng iyong pamamaraan na kumukumpirma na natsek ito sa ibang pasilidad.

Kung mayroon kang dispibrilador o pacemaker, mangyaring kontakin ang GI Lab bago ang iyong iniskedyul na pamamaraan.

Glenbrook	(847) 657-5780
Evanston	(847) 570-2236
Highland Park	(847) 480-2828
Skokie	(847) 933-6565

❖ Ilang mga araw bago ang pamamaraan:

- Bumili ng dalawang labatiba sa anumang tindahan ng gamot o parmasya na walang reseta.
- Itsek sa iyong kompanya ng seguro upang malaman kung kailangan mong maging sertipikado bago ang pamamaraan o kung kailangan mong kumuha ng reperal mula sa iyong manggagamot ng primaryang pangangalaga.

❖ Sa Araw ng Iyong Pamamaraan:

- Gamitin ang unang labatiba 2 oras bago ka dumating sa GI Lab.
- Gamitin ang ikalawang labatiba bago ka dumating sa GI Lab. Dapat humiga ka sa iyong kaliwang tagiliran kapag gumagamit ng labatiba. Upang makakuha ng pinakamahasag na resulta, subukang pigilin sa pinakamahasag posible (hal. 5 minuto)
- Kung iyong pamamaraan ay iniskedyul sa umaga, uminom lamang ng mga malinaw na likido para sa agahan.
- Kung iyong pamamaraan ay iniskedyul sa hapon, kumain ng magandang agahan at malinaw na likido para sa tanghalian.