

위내시경 또는 상부 위장관 내시경(EGD 또는 Upper GI Endoscopy) 준비 안내

이 안내사항은 **절차를 실시하기 1 주일 전에** 읽어보십시오.

위내시경 검사란 무엇인가요?

EGD(위내시경 또는 상부 위장관 내시경)는 지속적인 상부 위장의 통증, 메스꺼움, 구토, 삼킴 장애 증상을 검사하기 위해 실시됩니다. 상부 위장관(GI Tract)의 출혈 원인을 찾고 가능한 치료 방법을 제시하는 데도 이용됩니다.

언제 도착해야 하며 절차 시간은 얼마나 걸리나요?

절차 시작 30 분 전에 GI Lab 에 도착하도록 하십시오. 그래야 필요한 조치 및 마취(해당될 경우)를 실시하고 담당 의사가 환자 상태를 확인하며 절차에 필요한 적절한 조치를 취할 수 있습니다. GI Lab 에서 1 시간 반에서 2 시간 정도를 소요하게 됩니다.

주의 사항:

예정된 일정은 North Shore 에서 제공할 수 있는 가장 정확한 예정일입니다.

하지만, 긴급상황과 같은 불가피한 상황이 발생할 경우 예정일이 변경될 수 있습니다. 예정된 일정에 변동이 있을 경우 최선을 다해 귀하께 공지하도록 하겠습니다.

GI Lab 위치

| | | | | |
|---|-----------------------|---------|-------------------------|-----------------|
| Evanston Hospital | 2650 Ridge Ave | 1134 호실 | Evanston, IL 60201 | (847) 570-2236 |
| Glenbrook Hospital | 2100 Pfingsten Road | 1 층 | Glenview, IL 60026 | (847) 657- 5780 |
| Highland Park Hospital | 777 Park Ave West | B345 | Highland Park, IL 60035 | (847) 480-2828 |
| Highland Park Medical Group Gastroenterology | 1777 Green Bay Road | 201 | Highland Park, IL | (847) 681-4229 |
| Skokie Hospital | 9600 Gross Point Road | 1 층 | Skokie, IL 60076 | (847) 933-6565 |
| Vernon Hills Specialty Suites | 225 N. Milwaukee Ave. | 1 층 | Vernon Hills, IL 60061 | (847) 941-7660 |

당뇨를 앓고 있는 경우에는 어떻게 해야 하나요?

1 차 진료 의사(PCP)에게 EGD(위내시경 또는 상부 위장관 내시경) 검사 전에 당뇨병 약을 복용해야 하는지 문의하시고 지시에 따르십시오.

혈액 희석제를 복용하거나 심장 스텐트를 삽입한 경우에는 어떻게 해야 하나요?

심장 스텐트를 삽입했거나 Coumadin, Plavix, Ticlid, Lovenox, Pradaxa, Xarelto 또는 기타 혈액 희석제를 복용하는 경우, 처방 의사에게 절차 전에 해당 약물을 중단해야 하는지 확인하십시오. 이 중 하나 이상의

약물 복용을 계속해야 하는 경우에는 **North Shore**로 알려주십시오. 아스피린이나 기타 NSAID(Advil, Aleve, Ibuprofen 등)는 절차 전에 복용해도 좋습니다.

심장 세동 제거기 또는 맥박 조정기를 사용하는 경우에는 어떻게 해야 하나요?

검사 예정일 6 개월 전에 해당 장비를 검사하십시오. **NorthShore** 시설에서 검사할 수 없는 경우, 다른 검사 시설에서 해당 장비를 검사했다는 확인서를 절차 당일 가져오십시오.

심장 세동 제거기 또는 맥박 조정기를 사용하는 경우 검사 전 **GI Lab**으로 연락하십시오.

| | |
|---------------|----------------|
| Glenbrook | (847) 657-5780 |
| Evanston | (847) 570-2236 |
| Highland Park | (847) 480-2828 |
| Skokie | (847) 933-6565 |

❖ 절차 7 일 전 지침:

- EGD(위내시경 검사 또는 상부 위장관 내시경)에 대한 간략한 정보 프로그램은 <http://www.my-emmi.com/enhqi>에서 보실 수 있습니다.
- 절차 전 사전 승인을 받아야 하는지 또는 1차 진료 의사의 의뢰서가 필요한지에 대해 보험회사에 문의하십시오.

❖ □ 절차 하루 전 지침:

- 자정까지는 평소대로 식사하실 수 있습니다. 자정 후에는 아무 것도 먹거나 마시지 마십시오.
- **절차 당일 아침에 약물을 복용해야 하나요?** 심장약이나 혈압약을 복용하고 있는 경우 절차 당일 아침에는 해당 약품을 약간의 물과 함께 복용합니다. 다른 약물은 의사의 별도 지시가 없는 경우 절차 후에 복용할 수 있습니다.

특별 지시사항:

1. 절차 후 제시간에 귀가할 수 있도록 누군가 동행해 줄 수 있어야 하며 이는 **필수** 조치입니다. 보통 절차 시작 후 2-3 시간 후면 귀가하게 됩니다.
대중 교통을 이용할 예정이면 성인과 동행해야 합니다.
2. 절차 실시 과정에 진정제가 사용되며 따라서 절차 후 당일에는 운전을 하거나 기계를 조작하는 것은 안전하지 않습니다.
3. 절차 당일에는 직장으로 돌아갈 수 없습니다.
4. 절차 당일에는 중요한 결정을 내리지 마십시오.
5. 간호사와 상담을 하거나 절차를 취소해야 하는 경우 **NorthShore** 본사에 (847) 657-1900 번으로 전화하십시오. 절차를 취소해야 한다면 예정 검사일로부터 최소한 1 주일 전에 통보해 주십시오.