

Instrukcje dotyczące zabiegu kolonoskopii z użyciem preparatu MOVIPREP

Niniejsze instrukcje należy przeczytać na tydzień przed zabiegiem.

Na czym polega kolonoskopia?

Kolonoskopia to zabieg umożliwiający lekarzowi zbadanie nabłonka jelita grubego pod względem nieprawidłowości. Cienką, giętą rurkę z małą światłowodową kamerą wprowadza się do odbytnicy i powoli przesuwa do prosthicy i jelita grubego.

Kiedy mam przyjechać i ile czasu zajmie zabieg?

Do gabinetu zabiegowego należy przyjechać na 30 minut przed zabiegiem, aby pielęgniarka, anestezjolog (jeśli będzie brać udział) i lekarz mogli zbadać i przygotować pacjenta do zabiegu. Na wizytę w gabinecie zabiegowym należy zarezerwować około 1,5–2 godzin.

Należy pamiętać:

Wyznaczony termin to czas rozpoczęcia zabiegu oszacowany tak dokładnie, jak to tylko możliwe. W niektórych sytuacjach (takich jak przypadki nagłe) termin może ulec zmianie. Dokładamy wszelkich starań, aby z wyprzedzeniem informować pacjentów o ewentualnych zmianach terminów.

Lokalizacje gabinetów zabiegowych

| | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| Evanston Hospital | 2650 Ridge Ave. | Room 1134 | Evanston, IL 60201 | (847) 570-2236 |
| Glenbrook Hospital | 2100 Pflingsten Road | 1 st Floor | Glenview, IL 60026 | (847) 657-5780 |
| Highland Park Hospital | 777 Park Ave West | B345 | Highland Park, IL 60035 | (847) 480-2828 |
| Ravinia | 1777 Green Bay Road | 202 | Highland Park, IL | (847) 681-4229 |
| Skokie Hospital | 9600 Gross Point Road | 1 st Floor | Skokie, IL 60076 | (847) 933-6565 |
| Vernon Hills Specialty Suites | 225 N. Milwaukee Ave. | 1 st Floor | Vernon Hills, IL 60061 | (847) 941-7660 |

Jak powinna się przygotować osoba chora na cukrzycę?

Przed kolonoskopią należy skonsultować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania instrukcji dotyczących przyjmowania leków przeciw cukrzycy.

Jak powinna się przygotować osoba przyjmująca leki przeciwzakrzepowe lub mająca stent sercowy?

Osoba ze stentem sercowym LUB przyjmująca leki takie jak Coumadin, Plavix, Ticlid, Lovenox, Pradaxa, Xarelto lub dowolne inne leki przeciwzakrzepowe powinna skontaktować się z lekarzem, który je przepisał, w celu ustalenia, czy należy je odstawić przed zabiegiem. Jeśli lekarz zaleci, aby nie odstawiać któregośkolwiek z tych leków, należy skontaktować się naszym gabinetem. Przed zabiegiem nie trzeba odstawiać aspiryny ani innych niesterydowych leków przeciwzapalnych (Advil, Aleve, Ibuprofen itd.).

Jak powinna się przygotować osoba mająca defibrylator lub rozrusznik serca?

Urządzenie musi zostać skontrolowane w ciągu 6 miesięcy przed zabiegiem. Jeśli kontrola nie odbyła się w placówce NorthShore, w dniu zabiegu należy zabrać ze sobą dokumentację potwierdzającą kontrolę przeprowadzoną w innej placówce.

Osoby mające defibrylator lub rozrusznik serca muszą przed wyznaczonym terminem zabiegu powiadomić o tym gabinet zabiegowy.

| | | | |
|---------------|----------------|--------------|----------------|
| Glenbrook | (847) 657-5780 | Ravinia | (847) 681-4229 |
| Evanston | (847) 570-2236 | Skokie | (847) 933-6565 |
| Highland Park | (847) 480-2828 | Vernon Hills | (847) 941-7660 |

❖ Siedem dni przed zabiegiem:

- Zrealizować receptę (Moviprep) w aptece.
- Odstawić preparaty z żelazem, Pepto-Bismol i suplementy ziołowe.
- Jeśli to możliwe, nie spożywać żadnych ziaren, orzechów ani kukurydzy przez tydzień przed zabiegiem.
- W razie obaw dotyczących mdłości związanych z przyjmowaniem preparatu w ramach przygotowania jelita należy zadzwonić do naszego gabinetu pod numer (847) 657 1900 w celu uzyskania recepty na leki przeciw mdłościom.
- Obejrzeć krótki program informacyjny na temat kolonoskopii na stronie internetowej <http://www.my-emmi.com/northshore>.
- Skontaktować się z firmą ubezpieczeniową, aby sprawdzić, czy przed zabiegiem konieczne jest przedstawienie zaświadczenia lub uzyskanie skierowania od lekarza POZ.

❖ Dzień przed zabiegiem:

- Przygotować preparat Moviprep zgodnie z instrukcjami.
- Przez cały dzień konieczne będzie stosowanie diety opartej na klarownych płynach. Nie wolno spożywać żadnych czerwonych ani fioletowych płynów. Dozwolone są jedynie:

| | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zupy: | klarowny bulion, rosół lub consomme. |
| Napoje: | herbata, kawa, herbata/kawa bezkofeinowa, Kool-Aid, Gatorade, klarowne napoje gazowane takie jak 7UP, Sprite lub napój imbirowy. Do herbaty ani kawy NIE WOLNO dodawać wyrobów z mleka ani śmietanki. |
| Soki: | jabłkowy, z białych winogron, przecedzona lemoniada, lemoniada z limonek, napój pomarańczowy, Crystal Light. Dozwolony jest każdy przejrzysty sok bez cząstek owoców. |
| Desery: | lody wodne, sorbety, mrożony sok, JELL-O, landrynki. |

- **O godzinie 17:00** wsypać zawartość 1 torebki A i 1 torebki B do jednorazowego pojemnika.
- Dodać letnią wodę pitną do górnej kreski na pojemniku. Mieszać do rozpuszczenia.
- Pojemnik Moviprep ma 4 znaczniki działowe. Co 15 minut wypijać roztwór do następnego znacznika (około 8 uncji) aż do wypicia całego litra.
- Popić 16 uncjami dowolnego klarownego płynu.
- Jeśli szybkie picie wywołuje podrażnienie żołądka, płyn można pić wolniej, ale nie zmniejszając jego ilości. Picie przez słomkę może poprawić smak. Między picciem kolejnych szklanek preparatu można ssać drażetkę cytrynową. **W razie niewykonania przygotowania albo wymiotów należy zadzwonić do naszego gabinetu (847) 657-1900 i porozmawiać z lekarzem.**

Czego należy się spodziewać po rozpoczęciu przygotowania jelita?

Nastąpi wielokrotne wypróżnienie wodą. Początkowo mogą być odczuwane lekkie wzdęcia, ale uczucie to ustępuje wraz z kolejnymi wypróżnieniami. Biegunka może trwać nadal po zakończeniu picia roztworu.

❖ W dniu zabiegu:

- Pacjenci z terminem zabiegu między 8:00 a 12:00 przyjmują preparat od godziny 5:00, a pacjenci z terminem zabiegu po 12:30 przyjmują preparat od godziny 8:00.
- Wsypać zawartość 1 torebki A i 1 torebki B do jednorazowego pojemnika.
- Dodać letnią wodę pitną do górnej kreski na pojemniku. Mieszać do rozpuszczenia.
- Pojemnik Moviprep ma 4 znaczniki działowe. Co 15 minut wypijać roztwór do następnego znacznika (około 8 uncji) aż do wypicia całego litra.
- Popić 16 uncjami dowolnego klarownego płynu.

DO ZAKOŃCZENIA ZABIEGU NIE WOLNO PIĆ NIC INNEGO

Instrukcje specjalne:

1. Ktoś **musi** towarzyszyć pacjentowi w drodze do domu po zakończeniu zabiegu – zazwyczaj 2–3 godziny od jego rozpoczęcia. W przypadku planowanego korzystania ze środków transportu publicznego, w tym taksówki, pociągu, Ubera czy Lyft, konieczne będzie zapewnienie towarzystwa osoby dorosłej.
2. Podczas zabiegu stosowane są leki uspokajające, w związku z czym prowadzenie pojazdów lub kierowanie maszynami przez pozostałą część dnia jest niebezpieczne.
3. Osobom noszącym szkła kontaktowe **NIE WOLNO** ich zakładać w dniu zabiegu. Należy wziąć ze sobą okulary.
4. W dniu zabiegu nie można wrócić do pracy.

5. Przez pozostałą część dnia nie należy podejmować żadnych ważnych decyzji.
6. Aby porozmawiać z pielęgniarką lub odwołać zabieg, należy skontaktować się z naszym gabinetem głównym pod numerem (847) 657-1900. Jeśli odwołanie zabiegu jest konieczne, należy powiadomić nasz gabinet co najmniej tydzień przed wyznaczonym terminem.

Informacje na temat zakresu ubezpieczenia w przypadku kolonoskopii

Wyznaczono Panu/Pani termin kolonoskopii, badania okrężnicy (jelita grubego) przy użyciu giętkiego wziernika z oświetleniem. W razie dostrzeżenia zmian chorobowych podczas kolonoskopii zazwyczaj od razu wykonywana jest biopsja. Biopsja polega na wycięciu części lub całości obszaru zmiany chorobowej w celu jej pobrania i wykonania badań mikroskopowych.

Firmy ubezpieczeniowe różnie traktują kolonoskopię w zależności od zakresu polisy. Należy pamiętać, że jeśli kolonoskopię wyznaczono w ramach „badań profilaktycznych” (czyli nie ma Pan/Pani żadnych objawów ze strony jelit), a lekarz wykryje polip lub tkankę wymagającą wycięcia podczas zabiegu, kolonoskopia ta nie będzie już uznawana za zabieg profilaktyczny. Świadczenia ubezpieczeniowe mogą ulec zmianie, a polisa może być realizowana w inny sposób pod względem płatniczym.

Należy pamiętać:

Przed przystąpieniem do przygotowania i oczyszczania jelit należy skontaktować się z ubezpieczycielem, aby sprawdzić, czy konieczne jest wcześniejsze uzyskanie zatwierdzenia lub przedstawienie zaświadczenia, i upewnić się, kto ponosi koszty zabiegu. Na odwrocie karty ubezpieczeniowej powinien znajdować się numer, pod który należy zadzwonić.

Division of Gastroenterology
Medical Group
NorthShore University HealthSystem