

## Preparación para una EGD (Esofagogastroduodenoscopia o endoscopia GI superior)

Por favor lea estas instrucciones una semana antes de su procedimiento.

### ¿Qué es una EGD?

Una EGD (Esofagogastroduodenoscopia o endoscopia GI superior) se realiza para evaluar los síntomas de dolor abdominal superior persistente, náuseas, vómitos o dificultad para tragar. También se utiliza para encontrar la causa del sangrado del tracto GI superior y ofrecer un posible tratamiento.

### ¿Cuándo debo llegar y cuánto durará el procedimiento?

Por favor llegue al laboratorio GI 30 minutos antes del procedimiento, para que la enfermera, el anestesista (si procede) y el médico puedan evaluarlo y prepararlo para su procedimiento. Esté preparado para pasar aproximadamente 1 ½ a 2 horas en el laboratorio GI.

### Tenga en cuenta:

La hora prevista para su procedimiento es, según nuestros cálculos, cuando empezará su procedimiento. Pueden surgir circunstancias, por ejemplo situaciones de emergencia, que pudieran cambiar la hora programada. Haremos nuestro mejor esfuerzo para notificarle que cualquier cambio en el horario.

### Ubicaciones de los laboratorios de GI

<b>Hospital Evanston</b>	2650 Ridge Ave.	Oficina 1134	Evanston, IL 60201	(847) 570-2236
<b>Glenbrook Hospital</b>	2100 Pfingsten Road	1 <sup>er</sup> Piso	Glenview, IL 60026	(847) 657- 5780
<b>Highland Park Hospital</b>	777 Park Ave West	B345	Highland Park, IL 60035	(847) 480-2828
<b>Highland Park Medical Group Gastroenterology</b>	1777 Green Bay Road	201	Highland Park, IL	(847) 681-4229
<b>Skokie Hospital</b>	9600 Gross Point Road	1 <sup>er</sup> Piso	Skokie, IL 60076	(847) 933-6565
<b>Vernon Hills Specialty Suites</b>	225 N. Milwaukee Ave.	1 <sup>er</sup> Piso	Vernon Hills, IL 60061	(847) 941-7660

### ¿Qué debo hacer si soy diabético?

Por favor, pida a su médico de atención primaria (PCP) que le indique cómo proceder respecto a sus medicamentos para la diabetes antes de su EGD (Esofagogastroduodenoscopia o endoscopia GI superior).

### ¿Qué debo hacer si estoy tomando anticoagulantes o tengo un stent (endoprótesis) cardíaco?

Si tiene un stent cardíaco O si está tomando medicamentos, como Coumadin, Plavix, Ticlid, Lovenox, Pradaxa, Xarelto o cualquier otro anticoagulante, por favor póngase en contacto con su médico tratante para determinar si debe suspender este medicamento antes del procedimiento. Notifique a nuestro consultorio si le aconsejaron no suspender uno o más de estos medicamentos. Puede seguir tomando aspirina u otros AINE (Advil, Aleve, ibuprofeno, etc.) antes de su procedimiento.

**¿Qué debo hacer si tengo un desfibrilador cardíaco o un marcapasos?**

Su dispositivo debe ser revisado dentro de los 6 meses previos a su procedimiento programado. Si no ha sido revisado en una instalación de NorthShore, por favor traiga la documentación el día de su procedimiento que confirme que ha sido revisado en otro centro.

Si tiene usted un desfibrilador o un marcapasos, por favor póngase en contacto con el laboratorio de GI antes de su procedimiento programado.

Glenbrook	(847) 657-5780
Evanston	(847) 570-2236
Highland Park	(847) 480-2828
Skokie	(847) 933-6565

**❖ Siete días antes del procedimiento:**

- Visite <http://www.my-emmi.com/enhqi> para ver un breve programa de información sobre la EGD (Esofagogastroduodenoscopia o endoscopia GI superior).
- Consulte con su compañía de seguros si tiene que ser precertificado antes del procedimiento o si necesita obtener una remisión del médico de atención primaria.

**❖ El día previo al procedimiento:**

- Puede seguir comiendo con normalidad hasta la medianoche. No debe comer o beber nada después de la medianoche.
- **¿Debo tomar mis medicamentos en la mañana del procedimiento?** Si toma medicamentos para el corazón o para la presión arterial, debe tomarlos en la mañana del procedimiento con un pequeño sorbo de agua. Puede tomar otros medicamentos después el procedimiento a menos que su médico le indique otra cosa.

**Instrucciones especiales:**

1. Es **esencial** que alguien esté disponible para acompañarlo a casa en el momento oportuno después de la finalización de su procedimiento; normalmente de 2 a 3 horas después de la hora de inicio de su procedimiento. Si va a tomar el transporte público, tendrá que hacer los arreglos para que un adulto le acompañe.
2. Durante el procedimiento se hace uso de la sedación y no es seguro que usted conduzca o maneje maquinaria durante el resto del día.
3. No podrá volver a trabajar el día del procedimiento.
4. No debe tomar decisiones importantes durante el resto del día.

5. Si necesita hablar con una enfermera, o cancelar su procedimiento, por favor póngase en contacto con nuestra Oficina Principal al (847) 657-1900. Si tiene que cancelar su procedimiento, por favor notifique a nuestra consultorio al menos una semana antes de la fecha de su procedimiento programado.