

Soi đại tràng sigma

Vui lòng đọc các hướng dẫn này một tuần trước khi tiến hành thủ thuật của quý vị.

Soi đại tràng sigma là gì?

Soi đại tràng sigma linh hoạt là một thủ thuật chẩn đoán dùng để sàng lọc những bất thường trong đại tràng sigma. Thủ thuật này sẽ kiểm tra đại tràng sigma (thứ ba dưới cùng của đại tràng) bằng cách sử dụng một ống mềm có đèn chiếu sáng được đưa vào hậu môn và tiến đến góc trái đại tràng. Nó có thể lấy sinh thiết trong suốt thủ thuật này.

Khi nào tôi phải có mặt và thủ thuật này sẽ diễn ra trong thời gian bao lâu?

Vui lòng có mặt tại phòng GI Lab 30 phút trước khi tiến hành thủ thuật, để được chăm sóc, gây mê (nếu được áp dụng và bác sĩ có thể đánh giá tình trạng sức khỏe và chuẩn bị cho quý vị tiến hành thủ thuật. Dự kiến mất khoảng 1 ½-2 giờ tại phòng GI Lab.

Vui lòng lưu ý:

Thời gian chúng tôi sắp xếp cho quý vị tiến hành thủ thuật là thời gian phù hợp nhất để tiến hành thủ thuật cho quý vị.

Có thể phát sinh những trường hợp khẩn cấp, như: cấp cứu sẽ có thể làm thay đổi thời gian được sắp xếp trước đó. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thông báo cho quý vị nếu có bất kỳ thay đổi nào theo lịch trình.

Các Địa điểm của Phòng GI Lab

Bệnh viện Evanston	2650 Ridge Ave.	Phòng 1134	Evanston, IL 60201	(847) 570-2236
Bệnh viện Glenbrook	2100 Pfingsten Road	Tầng 1	Glenview, IL 60026	(847) 657- 5780
Bệnh viện Highland Park	777 Park Ave West	B345	Highland Park, IL 60035	(847) 480-2828
Highland Park Medical Group Gastroenterology	1777 Green Bay Road	201	Highland Park, IL	(847) 681-4229
Bệnh viện Skokie	9600 Gross Point Road	Tầng 1	Skokie, IL 60076	(847) 933-6565
Vernon Hills Specialty Suites	225 N. Milwaukee Ave.	Tầng 1	Vernon Hills, IL 60061	(847) 941-7660

Tôi phải làm gì nếu tôi bị bệnh tiểu đường?

Vui lòng yêu cầu bác sĩ chăm sóc chính (PCP) của quý vị hướng dẫn quý vị về việc uống thuốc trị bệnh tiểu đường trước khi tiến hành soi đại tràng sigma.

Tôi phải làm gì nếu tôi đang dùng thuốc chống đông máu hoặc đặt dây dẫn tim?

Nếu quý vị có đặt dây dẫn tim HOẶC quý vị đang sử dụng một loại thuốc chống hạn như Coumadin, Plavix, Ticlid, LovenoX, Pradaxa, Xarelto hoặc bất kỳ loại thuốc chống đông máu nào khác, vui lòng liên hệ với bác sĩ kê toa của quý vị để xác định xem liệu quý vị có nên ngưng sử dụng loại thuốc này trước khi tiến hành thủ thuật hay không. Thông báo cho phòng khám của chúng tôi nếu quý vị được khuyên là không phải ngưng dùng một hoặc nhiều các loại thuốc này. Quý vị có thể tiếp tục dùng aspirin hoặc các loại thuốc NSAID khác (Advil, Aleve, Ibuprofen, v.v) trước khi tiến hành thủ thuật.

Tôi phải làm gì nếu tôi đang sử dụng máy khử rung tim hoặc máy trợ tim?

Thiết bị của quý vị phải được kiểm tra trong thời hạn 6 tháng trước khi tiến hành thủ thuật. Nếu chưa được kiểm tra tại một cơ sở của NorthShore, vui lòng mang theo giấy tờ vào ngày tiến hành thủ thuật của quý vị để xác nhận rằng thiết bị đã được kiểm tra tại một cơ sở khác.

Nếu quý vị đang sử dụng máy khử rung tim hoặc máy trợ tim, vui lòng liên hệ với phòng GI Lab trước khi tiến hành thủ thuật theo lịch.

Glenbrook	(847) 657-5780
Evanston	(847) 570-2236
Highland Park	(847) 480-2828
Skokie	(847) 933-6565

❖ Một vài ngày trước khi tiến hành thủ thuật:

- Mua hai lọ thuốc làm sạch đại tràng fleet enema tại bất kỳ cửa hàng thuốc hoặc hiệu thuốc nào không cần toa.
- Hãy kiểm tra với công ty bảo hiểm của quý vị để biết được liệu quý vị có cần được chứng nhận trước khi tiến hành thủ thuật hay không hoặc liệu quý vị có cần xin giấy giới thiệu của bác sĩ chăm sóc chính của mình hay không.

❖ Vào Ngày Tiến hành Thủ thuật:

- Uống lọ fleet enema đầu tiên 2 giờ trước khi quý vị phải có mặt tại phòng GI Lab.
- Uống lọ fleet enema thứ hai 1 giờ trước khi quý vị phải có mặt tại phòng GI Lab. Quý vị nên nằm nghiêng sang bên trái khi sử dụng enema. Để có kết quả tốt nhất, hãy cố giữ nó càng lâu càng tốt (khoảng 5 phút)
- Nếu thủ thuật của quý vị được xếp lịch vào buổi sáng, chỉ ăn các loại đồ ăn lỏng vào bữa sáng.
- Nếu thủ thuật của quý vị được xếp lịch vào buổi chiều, hãy ăn sáng nhẹ và ăn đồ ăn lỏng vào bữa trưa.